



GATÚ

A boa
notícia
do campo

ONLINE

Sementes de azevém disponíveis



A Marangatú informa aos parceiros e produtores em geral que já se encontram disponíveis sementes de azevém. Neste ano, disponibilizamos duas cultivares: Beefbuilder III (tetraploide) e FABC1 (diploide).

A implantação de azevém, através da técnica da sobressemeadura é uma alternativa de estabelecimento de pastagens que tem por objetivo a exploração de forragens no período frio do ano, onde as gramíneas de clima tropical cessam ou diminuem drasticamente o seu crescimento, com consequente queda de desempenho dos ruminantes. Esta técnica não visa a troca da pastagem tropical. Trata-se, portanto, de uma “suplementação” via pastagem por um período determinado.

Este método pode utilizar ou não a dessecação das plantas tropicais através de herbicidas. Contudo, o uso do defensivo químico não visa a eliminação das plantas tropicais e sim refrear o desenvolvimento das mesmas, a fim de possibilitar o estabelecimento das gramíneas de clima frio, denominadas plantas de clima temperado.

A sobressemeadura de gramíneas de clima temperado é melhor explorada em regiões que vão desde o Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de algumas regiões de maior altitude de Minas Gerais, ou seja, em regiões onde há limitações de crescimento das gramíneas pela ocorrência de frio em determinada época do ano.

A sobressemeadura se dá sobre diversas gramíneas tropicais, por exemplo: Braquiarião, Tanzânia e Mombaça e gramíneas do Gênero Cynodon, tais como a Grama Estrela, o Coast Cross, o Tifton e etc.

O uso de gramíneas de clima temperado sobressemeadas em pastagens tropicais é muito utilizada para projetos de bovinocultura de leite a pasto, pois normalmente ambas as opções forrageiras possuem bom valor nutricional. Além disso, existe resposta à irrigação, o que pode aumentar ainda mais a lotação destas gramíneas em conjunto durante a estação fria do ano. Projetos de pecuária leiteira, no interior de São Paulo, possibilitam lotações de inverno de até 5 UA/ha com o uso de irrigação.

A adequação da forragem antes da sobressemeadura deve ser realizada com o objetivo de manter a massa com no máximo 20 cm de altura.

A sobressemeadura pode ser feita a lanço, porém com quantidades superiores de sementes (no caso do azevém, 50 kg/ha) e deve ser seguida de compactação, que pode ser realizada com a entrada de um grande número animais na área logo após a sementeira. Este tipo de método de sementeira se aplica melhor em propriedades pequenas, em especial fazendas de produção de leite.

Fonte: Departamento técnico Marangatú Sementes, com informações do site beefpoint

Marangatú Sementes Ltda

Via Anhanguera, km 313 - Caixa Postal 336 - Cep: 14001-970
Ribeirão Preto - SP - Brazil - Tel.: +55 (16) 3969-1159
marangatu@marangatu.com.br - www.marangatu.com.br

